

Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1955

Bezirk	Höhe NN								Winter- zehrung	Differenz zur Vor-Dekade in Gramm												
										April			Mai			Juni			Juli			Summe Tracht
		Oktober	Nov.	Dez.	Januar	Februar	März	1. Dek		2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek		
Dresden		-1330	-455	-440	-645	?	-1410	-4.280	-465	-435	-860	-110	40	2.030	1.600	1.600	3.800	-690	-620	890	2.500	
Karl-Marx-Stadt		-860	-450	-575	-665	?	-1145	-3.695	-430	-495	-875	-115	-285	1.730	2.150	750	2.900	-1.760	-830	-670	-1.625	
Leipzig		-1040	-420	-375	-715	?	-1615	-4.165	-525	-640	-885	900	-130	3.920	1.750	180	2.170	-1.410	270	-200	1.235	
		-1.077	-442	-463	-675	###	-1.390	-6.500	-473	-523	-873	225	-125	2.560	1.833	843	2.957	-1.287	-393	7	-1.750	

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der veröffentlichten Waagstockdaten in der alten "Leipziger Bienenzeitung" wiederhergestellt werden. Leider wurde kein Februarbericht veröffentlicht; im Aprilbericht wird jedoch eine Durchschnittsabnahme Okt-Apr von 6,5kg genannt.