

Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1956

Bezirk	Höhe NN								Winterzehrung	Differenz zur Vor-Dekade in Gramm												
										April			Mai			Juni			Juli			Summe Tracht
		Oktober	Nov.	Dez.	Januar	Februar	März	1. Dek		2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek		
Dresden		-885	-485	-430	-675	-685	-1450	-4.610	-435	-480	-625	-500	-140	4.810	465	-115	-945	1.030	530	-1.120	-2.135	
Karl-Marx-Stadt		-845	-515	-410	-635	-720	-1635	-4.760	-320	-335	-400	-565	80	4.375	435	-725	-1.290	2.190	30	-800	-2.085	
Leipzig		-775	-525	-465	-575	-615	-1765	-4.720	-375	-470	-540	-210	610	6.010	270	-275	-905	1.300	500	-1.570	-375	
		-835	-508	-435	-628	-673	-1.617	-4.697	-377	-428	-522	-425	183	5.065	390	-372	-1.047	1.507	353	-1.163	-1.532	

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der veröffentlichten Waagstockdaten in der alten "Leipziger Bienenzeitung" wiederhergestellt werden.