

## Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1958

Bezirk	Höhe NN								Differenz zur Vor-Dekade in Gramm												
								Winter- zehrung	April			Mai			Juni			Juli			Summe Tracht
		Oktober	Nov.	Dez.	Januar	Februar	März		1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	
Dresden		-980	-440	-460	-640	-1030	-760	-4.310	-400	-540	-650	-260	1.640	1.780	1.500	4.280	750	-110	870	-1.230	3.320
Karl-Marx-Stadt		-910	-450	-530	-900	-1200	-1050	-5.040	-550	-520	-680	-240	2.440	4.520	1.800	4.260	0	-730	-130	-1.380	3.750
Leipzig		-940	-460	-480	-760	-1220	-940	-4.800	-470	-510	-650	90	2.120	3.540	930	2.960	-550	-440	1.070	-1.070	2.220
		-943	-450	-490	-767	-1.150	-917	-4.717	-473	-523	-660	-137	2.067	3.280	1.410	3.833	67	-427	603	-1.227	3.097

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der veröffentlichten Waagstockdaten in der alten "Leipziger Bienenzeitung" wiederhergestellt werden.