

Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1960

Bezirk	Höhe NN								Differenz zur Vor-Dekade in Gramm												
		Winterzehrung							April			Mai			Juni			Juli			Summe Tracht
		Oktober	Nov.	Dez.	Januar	Februar	März	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek		
Dresden		-970	-350	-340	-490	-900	-1300	-4.350	-520	-900	-700	160	2.900	40	3.240	1.100	1.980	-930	1.330	-1.750	1.600
Karl-Marx-Stadt		-500	-400	-390	-700	-1030	-1420	-4.440	-630	-880	-520	-450	37.770	900	3.970	1.890	4.130	-1.330	810	-1.350	39.870
Leipzig		-650	-390	-500	-770	-1210	-1610	-5.130	-600	-790	-790	1.390	5.610	860	4.590	920	2.430	-620	690	-1.230	7.330
		-707	-380	-410	-653	-1.047	-1.443	-4.640	-583	-857	-670	367	15.427	600	3.933	1.303	2.847	-960	943	-1.443	16.267

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der veröffentlichten Waagstockdaten in der alten "Leipziger Bienenzeitung" wiederhergestellt werden.