

### Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1961

Bezirk	Höhe NN								Differenz zur Vor-Dekade in Gramm												
		Winter-zehrung							April			Mai			Juni			Juli			Summe Tracht
		Oktober	Nov.	Dez.	Januar	Februar	März	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek		
Dresden		-780	-490	-290	-520	-770	-1420	-4.270	-680	210	1.500	-10	-1.330	-720	30	480	2.950	1.240	-120	-1.390	-2.110
Karl-Marx-Stadt		-700	-440	-430	-830	-1160	-1290	-4.850	-800	100	1.340	-190	-1.060	-330	-340	250	1.720	350	-120	-1.390	-5.320
Leipzig		-770	-510	-490	-630	-1120	-1450	-4.970	-120	960	3.290	400	-1.140	-940	700	1.010	5.470	1.290	460	-530	5.880
		-750	-480	-403	-660	-1.017	-1.387	-4.697	-533	423	2.043	67	-1.177	-663	130	580	3.380	960	73	-1.103	-517

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der veröffentlichten Waagstockdaten in der alten "Leipziger Bienenzeitung" wiederhergestellt werden.