

## Waagstockbeobachtung in Sachsen - Trabosax 1970

Bezirk	Höhe NN	Winter- zehrung	Differenz zur Vor-Dekade in Gramm												
			April			Mai			Juni			Juli			Summe Tracht
			1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	1. Dek	2. Dek	3. Dek	
Dresden		-4.500	490	-740	-590	-470	840	160	880	2.590	3.390	1.530	1.140	-30	4.690
Karl-Marx-Stadt		-4.490	-490	-790	-820	650	20	90	2.350	2.020	2.280	1.920	730	150	3.620
Leipzig		-4.600	-470	-630	-610	-560	1.820	630	270	2.550	3.040	1.130	980	280	3.830
		-4.530	-157	-720	-673	-127	893	293	1.167	2.387	2.903	1.527	950	133	4.047

Die dargestellten Werte konnten mithilfe der 14tägig veröffentlichten Waagstockdaten in der "Garten- und Kleintierzucht" wiederhergestellt werden. Durch Beschluss wurde 1970 die Erfassung und Veröffentlichung der Monatswerte Oktober-März abgeschafft und nur noch der Gesamtwert der Winterzehrung zwischen 01.10. und 31.03. vermerkt.